



Färberkamille <i>Anthemis tinctoria</i> Korbblütengewächse	30 - 80	6 - 9 gelb	sonnig-halbschattig; trocken, kalkliebend, humusarm	ausdauernd, Färbepflanze, tolerant was Bodenbeschaffenheit betrifft	zahlreiche Wildbienenarten, spezialisiert auf Korbblütler sind z.B. Zottelbienen (Panurgus), die Mauerbiene <i>Osmia laeiana</i> , die Hosenbiene <i>Dasygoda hirtipes</i> oder d. Gewöhnliche Löcherbiene (<i>Osmia truncorum</i>) sowie einige Seidenbienenarten (Colletes); Schmetterlinge
Kornblume <i>Centaurea cyanus</i> Korbblütengewächse	20 - 100	6 - 10 blau	sonnig; kalkarm, trocken, mäßig nährstoffreich	anspruchslos	mehrere Arten der Sandbienen, Furchenbienen, Pelzbienen und Mauerbienen; Schwebfliegen und Tagfalter
Frühlings-Platterbse <i>Lathyrus vernus</i> Schmetterlingsblütler	20-40	4 - 5 rotviolett	sonnig-halbschattig; frisch, nährstoffreich, Lehm und Ton	anspruchslos, bildet Rhizome	Hummeln, einige Blattschneider- Keulhorn-, Masken-, Mauer-, Pelz- und Harzbienenarten, wenige Sandbienenarten, v.a. Platterbsen-Sandbiene (Andrena lathyri), Platterbsen-Mörtelbiene (Megachile erictorum), Seidenbiene Colletes marginatus
Vogel-Wicke <i>Vicia cracca</i> Schmetterlingsblütler	30-120	6 - 8 blauviolett	sonnig-halbschattig frisch bis mäßig trocken, Lehm und Ton	Rankpflanze	einige Blattschneider- Keulhorn-, Masken-, Mauer-, Pelz- und Harzbienenarten, wenige Sandbienenarten, v.a. Mai-Langhornbiene (Eucera longicornis), Frühe Langhornbiene (Eucera nigrescens), Platterbsen- Sandbienen Andrena lathyri
Acker-Vergissmeinnicht <i>Myosotis arvensis</i> Raublattgewächse	10 - 40	4 - 10 blau	sonnig-halbschattig; frische, nährstoffreiche Lehmböden	anspruchslos, Verbreitung der Samen durch Ameisen	Buntfarbige Blattschneiderbiene (<i>Megachile versicolor</i>), Zweifleck-Pelzbiene (<i>Anthophora bimaculata</i>) und Vierfleck-Pelzbiene (<i>Anthophora quadrifasciata</i>), mehrere Furchenbienenarten; Fliegen und Schmetterlinge
Geflecktes Lungenkraut. <i>Pulmonaria officinalis</i> Raublattgewächse	10 - 20	2 - 4 blau-violett	halbschattig-schattig; frisch, nährstoffreich, kalkhaltig, Ton, Lehm	Heilpflanze, Wintergrüne Blätter	Pelzbienen, bes. Gemeine Pelzbiene (<i>Anthophora plumipes</i>); Schmetterlinge, Schwebfliegen
Gewöhnlicher Natterkopf <i>Echium vulgare</i> Raublattgewächse	25 - 100	5 - 10 blau	sonnig; durchlässig, sandig-lehmig, humusarm	gute Bienenweide, Pionierpflanze	zahlreiche Arten der Maskenbienen, Schmalbienen, Mauerbienen, Pelzbienen und Hummeln, v.a. Natterkopf-Mauerbiene (<i>Osmia adunca</i>); zahlreiche Schmetterlinge, Schwebfliegen
Großblütige Braunelle <i>Prunella grandiflora</i> Lippenblütengewächse	10 - 30	6 - 8 violett	sonnig-halbschattig; Trocken bis halbtrocken,	winterhart, mehrjährig	Wildbienen und Schmetterlinge, Waldpelzbiene (<i>Anthophora furcata</i>), Vierfleck Pelzbiene (<i>Anthophora quadrifasciata</i>)