

Pflanzenliste von Stauden, die von Februar bis Juli blühen

Pflanze	Blütenfarbe	Blütenmonat	Wuchshöhe in cm	Standort und Ansprüche	Besonderheiten
Frühjahr					
Schneerose (<i>Helleborus niger</i>)	weiß	II/IV	20-40	Halbschatten, Schatten	Wildstaude; Wildbienen
Winterling (<i>Eranthis hyemalis</i>)	gelb	II/III	10-20	Halbschatten, Schatten	Kulturform; Wildbienen, Fliegen
Schneeglöckchen (<i>Galanthus nivalis</i>)	weiß	II/III	10-20	Sonne, Halbschatten	Kulturform; Wildbienen
Blaustern (<i>Scilla siberica</i>)	blau	II/III	10-20	Halbschatten, feuchte Wiesen	Kulturform; erste Blüher; Wildbienen
Bauern-Krokus (<i>Crocus tommasinianus</i>)	pink	II/III	10-15	Sonne, Halbschatten	Kulturform; erste Blüher; Wildbienen
Märzenbecher (<i>Leucojum vernum</i>)	weiß	II/III	20-30	Halbschatten	Wildstaude; Wildbienen
Engelstränen-Narzisse (<i>Narcissus 'Thalia'</i>)	weiß	IV/V	30-40	Sonne, Halbschatten	Kulturform; Wildbienen
Buschwindröschen (<i>Anemone nemorosa</i>)	weiß	IV/VI	10-20	Lehm Boden; Halbschatten, Schatten	Wildstaude; Wildbienen und Fliegen
Klatschmohn (<i>Papaver rhoeas</i>)	rot	IV/VI	40-60	Sonne, Halbschatten	Wildstaude; Wildbienen und Honigbienen
Gelbes Buschwindrös. (<i>Anemone ranunculoides</i>)	gelb	IV/V	10-20	Lehm Boden; Halbschatten, Schatten	Wildstaude; Wildbienen und Fliegen
Frühlings-Platterbse (<i>Lathyrus vernus</i>)	rotviolett	IV/V	30-40	Halbschatten, kalkhaltige Böden	Wildstaude; Wildbienen und Fliegen
Waldmeister (<i>Galium odoratum</i>)	weiß	IV/V	20-30	Halbschatten, Schatten	Wildstaude; Wildbienen und Fliegen
Bärlauch, Waldknoblauch (<i>Allium ursinum</i>)	weiß bis hellrosa	IV/V	40-80	Sonne; mäßig trockene Standorte	Wildstaude; Gewürz; Wildbienen, Hummeln und Fliegen
Weibl. Salomonssiegel (<i>Polygonatum multiflorum</i>)	weiß	V/VI	40-60	Halbschatten, Schatten	Wildstaude; Arzneipflanze; Bienen, Hummeln
Thymian (<i>Thymus vulgaris</i>)	weiß	V/VI	20-40	Sonne, trocken	Wildstaude; Duft-/Arzneipflanze; Honig- und Wildbienen
Roter Fingerhut (<i>Digitalis purpurea</i>)	rot	VI/VIII	30-150	Sonne, Halbschatten	Wildstaude; Arzneipflanze; Bienen, Hummeln
Blutwurz (<i>Potentilla erecta</i>)	gelb	VI/III	10-30	Sonne, stickstoffreiche Böden	Wildstaude; Arzneipflanze; Bienen, Wildbienen
Malgelöckchen (<i>Convallaria majalis</i>)	weiß	V/VI	20-40	Halbschatten, Schatten	Wildstaude; Bienen, Wildbienen
Gemeine Akelei (<i>Aquilegia vulgaris</i>)	violettblau	V/VII	30-60	Halbschatten, kalkreicher Boden	Wildstaude; Wildbienen, Hummeln und Fliegen
Gemeiner Odermennig (<i>Agrimonia eupatoria</i>)	gelb	V/VIII	40-50	Halbschatten	Wildstaude; Arzneipflanze; Bienen, Hummeln, Fliegen
Tüpfel-Johanniskraut (<i>Hypericum perforatum</i>)	gelb	V/VII	30-70	Sonne, Halbschatten	Wildstaude; Bienen, Wildbienen, Fliegen